



آمینوتکا پی (AminoTeca P[®])

کود تخصصی ریشه زایی، گل انگیزی و انرژی زایی گیاهی با تکنولوژی نوین CBT



شرکت آریانام نهاده
نگاهی نو به فردا



شرکت آریانام نهاده

- آمینوتکا پی نسل جدید کودهای فسفره با تکنولوژی جدید CBT است که برخلاف فرمولاسیون های گذشته ترکیبی کاملاً کمپلکس شده است.
- آمینوتکا پی فاقد کلر بوده و حاوی کمترین میزان ایندکس نمک می باشد.
- آمینوتکا پی جزء کودهای طبقه بندی شده کلاس کیفی آ (Class A) بوده که حاوی کمترین میزان فلزات سنگین و خطرات سوء ناشی از آنها در انسان و حیوانات است.
- آمینوتکا پی حاوی فسفر با فرمول ارتوفسفات می باشد که برخلاف فرمولاسیون های رایج پلی فسفات قابلیت آن را دارد که به سرعت جذب گیاه شده و در خاک جا به جا شود.
- آمینوتکا پی حاوی اسیدهای آمینه آزاد آلفا پرولین، لیسین، متیونین، گلوتامیک اسید، هیستیدین و آرژنین است که در باروری و افزایش درصد جوانه زنی دانه گرده، افزایش طول دانه گرده، تسریع گلدهی و بیوسنتز هورمون های مؤثر در تشکیل گل می شود.
- آمینوتکا پی به صورت کمپلکس کامل فسفر به شکل کپسولهای میکرونی است که بواسطه حامل های بیوپیتید (CBT) از نوع اسیدهای آمینه با وزن ملکولی پایین می باشد.
- آمینوتکا پی به دلیل کمپلکس شدن به روش (CBT) و احاطه شدن توسط طیف وسیع رادیکالهای آزاد قابلیت به کارگیری در آبهای سخت، شور، قلیایی با میزان بالای ترکیبات کلرید، کربنات و بی کربنات را دارد.
- آمینوتکا پی به دلیل وجود اسیدهای آمینه آزاد آلفا متیونین موجب افزایش جمعیت میکروارگانیسم های مفید و تحریک ریشه زایی می شود. از سوی دیگر تریپتوفان موجب تحریک تولید هورمون اکسین و تسریع فرآیند ریشه زایی می گردد.



شرکت آریانام نهاده

عناصر	نیتروژن	فسفر (ارتوفسفات)	اسیدهای آمینه آزاد آلفا	قندهای مونو، دی و پلی ساکارید	مواد آلی گیاهی
درصد	۳/۲	۳۲/۵	۳/۹	۲/۶	۸

نام محصول	شیوه و میزان مصرف		زمان مصرف
	محلولپاشی	کودآبیاری	
گیاهان زراعی	۱ لیتر در هکتار	۳ لیتر در هکتار	مرحله ۴ تا ۶ برگ، قبل از گلدهی، و در طول رشد میوه
گیاهان صنعتی	۱ لیتر در هکتار	۳ لیتر در هکتار	مرحله ۴ تا ۶ برگ، قبل از گلدهی، همراه با علف کش ها و قارچکش ها
درختان میوه	۱ لیتر در ۱۰۰۰ لیتر آب	۳-۴ لیتر در هکتار	بعد از ریزش گلبرگ ها و در طول رشد میوه
مرکبات	۱ لیتر در ۱۰۰۰ لیتر آب	۳ لیتر در هکتار	قبل از گلدهی، زمانی که میوه ۲ تا ۳ سانتی متری شده است و تکرار ۳ هفته بعد
زیتون	۱ لیتر در ۱۰۰۰ لیتر آب	۳-۴ لیتر در هکتار	قبل از گلدهی و زمانی که میوه ۱ تا ۲ سانتی متر شده است
پسته	۱ لیتر در ۱۰۰۰ لیتر آب	۳-۴ لیتر در هکتار	قبل از گلدهی، زمانی که میوه ارزنی شده است و در مرحله رشد میوه
گل و گیاهان زینتی	۱ لیتر در ۱۰۰۰ لیتر آب	۴-۵ لیتر در هکتار	مرحله ۴ تا ۶ برگ و تکرار هر ۲ هفته یکبار



شرکت آریانام نهاده

بیشتر بدانیم

- عنصر فسفر موجب تحریک رسیدن بذر و میوه، رشد و توسعه ریشه ها، رشد مریستم انتهایی و تولید انرژی از طریق دخالت در چرخه ATP در گیاه می شود.
- آمینوتکا پی با ترکیبات قلیایی شدید، روغن های معدنی، کلسیم، مس و گوگرد قابل اختلاط نمی باشد.

آدرس: تهران، اشرفی اصفهانی، خیابان معین، ساختمان اداری- تجاری معین، پلاک ۳۳، طبقه اول، واحد C1

صندوق پستی: ۱۴۵۱۵/۱۵۵

تلفن های تماس: ۴۴۸ ۶۰ ۶۴۵ - ۴۴۸ ۶۰ ۶۳۹ - ۴۴۸ ۵۴ ۶۳۰ (۰۲۱) تلفکس: ۴۴۸ ۴۹ ۲۷۱ (۰۲۱)



اسکن کنید و به ما بپیوندید

WWW.ARYANAM.COM