



آمینوتکا کلسیو (AminoTeca Calcio®)

غنی ترین کلات کلسیم مایع سیستمیک



شرکت آریانام نهاده
نگاهی نو به فردا



شرکت آریانام نهاده

- عنصر کلسیم در خاکهای ایران بنابر کمبود مواد آلی خاک، قلیائیت بالای خاک، عناصر تثبیت شده فراوان در خاک عموماً توسط گیاهان غیر قابل برداشت است کمبود کلسیم در ایران یکی از شایع ترین علائم کمبود به شمار می رود.
- آمینوتکا کلسیو ترکیبی غنی از کلسیم است که توسط اسیدهای آمینه آزاد با منشاء گیاهی، گلوتامیک اسید، آلانین، گلایسین و لیسین به صورت کامل کلاته شده است لذا نمی تواند به آسانی در درون گیاه جا به جا شود.
- کلات های اسید آمینه به دلیل نداشتن بار الکتریکی بدون هیچگونه تغییر شیمیایی می توانند توسط لایه کوتیکولی برگ جذب گیاه شوند لذا در مناطق گرم و شور ایران احتمال گیاهسوزی را به شدت کاهش می دهد.
- کلسیم در گیاه نقش اساسی ایفا می کند چراکه این عنصر ماده اولیه تشکیل دهنده دیواره سلولی است که با ایجاد پکتین در دیواره سلولها مانند سیمان عمل کرده و موجب استحکام بافت گیاه و میوه می شود.

عناصر	کلسیم محلول در آب	نیتروژن	کلات اسیدهای آمینه آزاد
درصد	۲۰	۸	۲/۸



شرکت آریانام نهاد

نام محصول	شیوه مصرف	میزان مصرف	توصیه مصرف
صیفی جات	محلولپاشی	۱ لیتر در هکتار	پس از تشکیل میوه، قبل از رنگ انداختن و در زمان استرس گرمایی
هندوانه و خربزه	محلولپاشی	۱ لیتر در هکتار	پس از تشکیل میوه، درشت شدن میوه، قبل از رسیدن میوه
سبزیجات برگی	محلولپاشی	۱ لیتر در هکتار	در طول رشد رویشی
پنبه	محلولپاشی	۱ لیتر در هکتار	بین مرحله ۵ تا ۷ برگگی و گلدهی
سیب زمینی	محلولپاشی	۱ لیتر در هکتار	زمان تشکیل غده ها
توت فرنگی	محلولپاشی	۱ لیتر در هکتار	پس از تشکیل میوه و قبل از رنگ انداختن میوه
انگور	محلولپاشی	۱ لیتر در ۱۰۰۰ لیتر آب	از زمان ظهور غوره تا رسیدن کامل میوه
سیب و گلابی	محلولپاشی	۱ لیتر در ۱۰۰۰ لیتر آب	تورم جام گل، رشد رویشی، قبل از رنگ انداختن میوه، قبل برداشت و پس از برداشت
گیلاس و آلبالو	محلولپاشی	۱ لیتر در ۱۰۰۰ لیتر آب	هنگام رشد میوه و هنگام رنگ انداختن میوه
هلو و شلیل	محلولپاشی	۱ لیتر در ۱۰۰۰ لیتر آب	قبل گلدهی، پس از تشکیل میوه و هنگام رشد میوه
کیوی	محلولپاشی	۱ لیتر در ۱۰۰۰ لیتر آب	از زمان گردویی شدن میوه تا رشد کامل میوه
انار	محلولپاشی	۱ لیتر در ۱۰۰۰ لیتر آب	قبل گلدهی، زمان گردویی شدن میوه تا رشد کامل میوه
مرکبات	محلولپاشی	۱ لیتر در ۱۰۰۰ لیتر آب	اوایل میوه دهی، رشد میوه، قبل برداشت و بعد برداشت
پسته	محلولپاشی	۱ لیتر در ۱۰۰۰ لیتر آب	تورم جوانه، رشد میوه، پر کردن مغز میوه و پس از برداشت



شرکت آریانام نهاده

بیشتر بدانیم

- کمبود کلسیم در گیاهان بیش از ۳۵ نوع عوارض فیزیولوژیک در میوه پدید می آورد که از شایعترین آنها می توان به لکه سیاه سیب، لکه چوب پنبه ای، مغز لهیدگی سیب، پوسیدگی گلگاه گوجه فرنگی و لکه پوست استخوانی پسته اشاره نمود.
- کمبود کلسیم در گیاهان موجب بدشکل شدن اندام های هوایی، پیچیدگی و قاشقی شدن برگها و پوسیدگی میوه می گردد.
- کلات های اسید آمینه به دلیل نداشتن بار الکتریکی بدون هیچگونه تغییر شیمیایی می توانند توسط لایه کوتیکولی برگ جذب گیاه شوند لذا در مناطق گرم و شور ایران احتمال گیاهسوزی را به شدت کاهش می دهد.
- آمینوتکا کلسیو با ترکیبات قلیایی شدید، روغن های معدنی، ترکیبات مسی و گوگرد قابل اختلاط نمی باشد.

آدرس: تهران، اشرفی اصفهانی، خیابان معین، ساختمان اداری - تجاری معین، پلاک ۳۳، طبقه اول، واحد C1

صندوق پستی: ۱۴۵۱۵/۱۵۵

تلفن های تماس: ۴۴۸ ۶۰ ۶۴۵ - ۴۴۸ ۶۰ ۶۳۹ - ۴۴۸ ۵۴ ۶۳۰ (۰۲۱) تلفکس: ۴۴۸ ۴۹ ۲۷۱ (۰۲۱)



اسکن کنید و به ما بپیوندید

WWW.ARYANAM.COM