



تکا فسفیتو (Teca Fosfito®)

قارچ کش و باکتری کش سیستمیک و محرک رشد گیاهی



شرکت آریانام نهاده  
نگاهی نو به فردا



## شرکت آریانام نهاده

- تکا فسفیتو از منبع کودی اسید فسفرو ( $H_3PO_3$ ) منشاء گرفته است که در فرآیند ترکیب شدن با هیدروکسید پتاسیم به فسفیت پتاسیم ( $K_2HPO_3$ ) می گردد.
- تکا فسفیتو حاوی کمترین میزان فلزات سنگین مضر برای سلامتی انسان و حیوانات می باشد که در درجه کیفی آ (Class A) دسته بندی شده است.
- تکا فسفیتو قابلیت حرکت دوطرفه (از اندام های هوایی به طرف پایین و از مسیر ریشه به سمت اندام های هوایی) در گیاه می تواند بیماریهای قارچی مرگ گیاهچه، بوته میری جالیز، سفیدک کرکی (دروغین)، گموز مرکبات، لکه موجی سیب زمینی و گوجه فرنگی، شانکر سافه و طوقه سیب زمینی و کدوئیان را کنترل کند.
- تکا فسفیتو قابلیت کنترل بیماری های باکتریایی ناشی از *Erwin asp.* و *Pseudomonas sp.* را دارد.
- تکا فسفیتو با تحریک سیستم دفاعی گیاهی (به تولید فیتوآلکسین ها) ویژگی پیشگیری کننده، ایمن کننده و درمان کننده را بر علیه بیماریهای باکتریایی و قارچی پدید می آورد.
- تکا فسفیتو موجب کنترل بیماریهای قارچی و باکتریایی، افزایش تعداد گل و میوه، زودرسی نسبی محصول، افزایش وزن و اندازه میوه، بهبود ماندگاری و خاصیت انبارداری، بهبود کیفیت میوه و تحریک ریشه زایی گیاهان می گردد.

عناصر	مونو و دی پتاسیم فسفیت	فسفر (به صورت فسفیت)	پتاسیم (محلول در آب)
درصد	۷۰	۴۲	۲۸



## شرکت آریانام نهاد

نام محصول	شیوه و میزان مصرف	توصیه مصرف
انگور	محلولپاشی ۲ لیتر در ۱۰۰۰ لیتر آب	قبل از گلدهی، پس از تشکیل میوه، غوره شدن میوه و قبل از تغییر رنگ میوه
مرکبات	محلولپاشی ۲ لیتر در ۱۰۰۰ لیتر آب	پس از تشکیل میوه، فندقی شدن میوه، رشد میوه و قبل از تغییر رنگ میوه
خیار	محلولپاشی ۲ لیتر در هکتار	خزانه، بعد از نشاء کاری، رشد رویشی و رشد میوه
درختان میوه دانه دار	محلولپاشی ۲ لیتر در ۱۰۰۰ لیتر آب	قبل از گلدهی، پس از تشکیل میوه، رشد میوه و قبل از تغییر رنگ میوه
هندوانه و خربزه	محلولپاشی ۲ لیتر در هکتار	خزانه، بعد از نشاء کاری، رشد رویشی و رشد میوه
سبزیجات غده ای	محلولپاشی ۲ لیتر در هکتار	خزانه، بعد از نشاء کاری، رشد رویشی و رشد میوه
سبزیجات برگی	محلولپاشی ۲ لیتر در هکتار	۲ هفته پس از کشت و تکرار ۲ هفته بعد
غلات دانه ریز	محلولپاشی ۲ لیتر در هکتار	بعد از جوانه زنی، قبل از گلدهی و قبل از رسیدن دانه
پیاز	محلولپاشی ۲ لیتر در هکتار	مرحله ۳ برگگی، شروع غده بندی و ۲ هفته بعد
ذرت	محلولپاشی ۲ لیتر در هکتار	بعد از جوانه زنی، قبل از گلدهی، و قبل از رسیدن دانه
سیب زمینی	محلولپاشی ۲ لیتر در هکتار	مرحله ۳ برگگی، شروع غده بندی و ۲ هفته بعد
کیوی	محلولپاشی ۲ لیتر در ۱۰۰۰ لیتر آب	گردویی شدن میوه، درشت شدن میوه و قبل از رسیدن میوه
زیتون	محلولپاشی ۲ لیتر در ۱۰۰۰ لیتر آب	پس از تشکیل میوه، رشد میوه و قبل از تغییر رنگ میوه
پسته	محلولپاشی ۲ لیتر در ۱۰۰۰ لیتر آب	ارزنی شدن میوه، درشت شدن میوه و پرکردن مغز میوه



شرکت آریانام نهاده

بیشتر بدانیم

- تکا فسفتو با ترکیبات مسی قابل اختلاط نمی باشد ( در صورت تمایل به مصرف ترکیبات مسی، تکا فسفتو را به صورت مجزا سک یا دو هفته بعد از ترکیبات مسی مصرف نمایند)
- تکا فسفتو با ترکیبات قلیایی شدید، ترکیبات غنی از کلسیم، گوگرد، روعن های معدنی و اسید هیومیک قابل اختلاط نمی باشد.
- تکا فسفتو با سموم دینوکاپ، دیمتوات و دیکوفول قابل اختلاط نمی باشد.
- در صورت مصرف تکا فسفتو به روش کود آبیاری میزان ۴-۵ لیتر در هکتار توصیه می شود.

آدرس: تهران، اشرفی اصفهانی، خیابان معین، ساختمان اداری - تجاری معین، پلاک ۳۳، طبقه اول، واحد C1

صندوق پستی: ۱۴۵۱۵/۱۵۵

تلفن های تماس: ۴۴۸ ۶۰ ۶۴۵ - ۴۴۸ ۶۰ ۶۳۹ - ۴۴۸ ۵۴ ۶۳۰ (۰۲۱) تلفکس: ۴۴۸ ۴۹ ۲۷۱ (۰۲۱)



اسکن کنید و به ما بپیوندید

[WWW.ARYANAM.COM](http://WWW.ARYANAM.COM)